

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA
Facoltà di Agraria
Dipartimento di Scienze Agro-ambientali, chimica e difesa Vegetale (DiSACD)

CITTA' DI BARLETTA
Assessorato Assetti del Territorio e Sviluppo Turistico Produttivo

Bollettino Fitosanitario n° 9 del 22/06/2011

VITE

Fase fenologica: prechiusura del grappolo, chiusura del grappolo.

PERONOSPORA: Nei vigneti non si riscontrano attacchi di peronospora. Mantenere comunque protetta la vegetazione con agrofarmaci citotropici e sistemici.

OIDIO: Sono state osservate infezioni oidiche su grappoli, talvolta anche in modo grave. Si consiglia di alternare a breve distanza di tempo (2-3 gg) prodotti sistemici con citotropici, oppure solforazioni in polvere o, con zolfo liquido.

BOTRITE: Si raccomanda, di eseguire un trattamento in prechiusura del grappolo con un antibotritico (fluazinam, fenexamid, boscalid, pirimetanil, mepanipirim, fludioxonil+ciprodinil)**.**

MAL dell' ESCA: Sono stati notati sintomi riconducibili al Mal dell'Esca.

TIGNOLETTA: Si avvisa, inoltre, che le catture degli adulti di Tignoletta sono diminuite, ed è opportuno intervenire con prodotti curativi (esteri fosforici, etc.).

OLIVO

Fase fenologica: ingrossamento drupe

In questa settimana è stato raggiunto il picco più alto della presenza della Tignola (*Prays oleae*)**,** quindi tra la fine di questa e l'inizio della prossima settimana è consigliabile intervenire contro questo insetto con prodotti a base di Fosmet o Dimetoato**.** Inoltre è stata osservata la presenza di occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*).